

## SCHADBILDCHECK

Schnellhilfe zur Abgrenzung von Symptombildern – nicht verwechseln → richtig handeln. Damit Sie im entscheidendem Moment die richtige Entscheidung treffen, stellen wir ein paar Verwechslungsmöglichkeiten vor.

| Natürlicher Feind   | Schädling   |
|---|---|
|   |      |
| <p>Durch Erzwespen parasitierte Puppen der Weißen Fliege</p>                        | <p>Schwarze Überwinterungseier von Blattläusen</p>                                      |
| <p>Einsatz von <i>Encarsia formosa</i> erfolgreich</p>                              | <p>Winterspritzungen mit Pflanzenschutzmitteln auf Basis von Paraffinöl oder Rapsöl</p> |
|  |     |
| <p>Raubmilbe <i>Phytoseiulus persimilis</i></p>                                     | <p>Rote Spinnmilbe</p>  |
| <p>Raubmilbenentwicklung durch Erhöhung der Luftfeuchtigkeit fördern</p>            | <p>Öle spritzen oder Raubmilben einsetzen</p>   |



Räuberische Larve des Nützlings  
Schwebfliege

Blattläuse nur mit nützlingsschonenden  
Mitteln spritzen oder gar nicht



Larve eines schädlichen Blattminierers

Schwer bekämpfbarer Schädling.  
Symptome sind immer Gang- oder  
Platzminen



Junges Stadium einer Blumenwanze  
*Orius sp.*

Die Raubwanze durch weitgehenden  
Verzicht von chemischen  
Pflanzenschutzmitteln fördern



Larvenstadium eines  
pflanzenschädigenden Thrips

Vorzugsweise Einsatz der Raubmilbe  
*Amblyseius cucumeris*